



Informació de les vacunes no finançades, no incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut . Generalitat de Catalunya

Vacuna intranasal contra la grip.

El Departament de Salut indica i finança les vacunes incloses en el Calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçades a tota la població, i també aquelles que estan indicades en situacions de risc de manera individual.

Alguns clínics i societats científiques fan recomanacions de vacunes fora de les indicacions oficials. Aquestes vacunes no estan finançades i necessiten la prescripció mèdica per ser administrades.

Vacunes disponibles

Vacuna intranasal contra la grip. Fluenz®Tetra.

La grip estacional és una infecció que anualment afecta al 5-10% d'adults i al 20-30% de nens. Tots els individus són susceptibles a la grip i a les seves complicacions associades, essent les més freqüents la pneumònia i l'otitis mitjana. La vacuna Fluenz®Tetra és una vacuna de virus vius atenuats indicada per la prevenció de la grip en nens i adolescents a partir dels 24 mesos i fins als 18 anys. Ha de ser administrada durant la tardor de cada any (d'octubre a desembre en l'hemisferi nord) abans de l'inici de la temporada gripal. La vacunació és anual.

Fluenz®Tetra s'administra per via intranasal, un volum de 0.2ml, administrats a raó de 0,1 ml a cada fossa nasal.

Pot produir efectes adversos en alguns individus, essent la gran majoria breus i de naturalesa lleu. Els més freqüents són congestió nasal i mucositat, disminució de la gana, debilitat i mal de cap.

<i>Edat</i>	<i>Immunització primària</i>	<i>Intervals mínims entre dosis primàries</i>
24 mesos a 18 anys	1 dosi Per a nens que no han estat vacunats abans contra la grip estacional, s'ha d'administrar una segona dosi després d'un interval mínim de 4 setmanes.	Interval mínim de 4 setmanes quan siguin necessàries dues dosis



Riscos generals

L'administració de qualsevol vacuna pot provocar una reacció local amb envermelliment, edema, dolor i febre.

En molt rares ocasions poden produir una reacció greu que requereixi algun tipus de tractament.

La fitxa tècnica i el prospecte descriuen de forma detallada els efectes adversos específics de cada vacuna.

Precaucions per la conservació de les vacunes

Un cop s'ha rebut la recomanació de vacuna no sistemàtica no finançada, per part d'un professional de la salut, s'ha de comprar a la farmàcia amb el document de prescripció mèdica corresponent. S'ha de transportar en bosses refrigerades evitant el contacte directe amb els acumuladors de fred. No exposar-la a la llum ni a fonts de calor.

S'han de mantenir en nevera entre 2 i 8 graus, no deixar-les a temperatura ambient. Les vacunes no han de tocar la paret posterior de la nevera, i tampoc s'han de guardar a la porta de la nevera. El trencament de la cadena de fred, pot suposar la pèrdua d'efectivitat de la vacuna.

Per saber-ne més:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/>

<http://www.vacunas.org/gripe-2/>