



Informació de les vacunes no finançades, no incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut . Generalitat de Catalunya

Vacuna contra el pneumococ conjugada

El Departament de Salut indica i finança les vacunes incloses en el Calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçades a tota la població, i també aquelles que estan indicades en situacions de risc de manera individual.

Alguns clínics i societats científiques fan recomanacions de vacunes fora de les indicacions oficials. Aquestes vacunes no estan finançades i necessiten la prescripció mèdica per ser administrades.

Vacunes disponibles

Actualment hi ha comercialitzades la vacuna Prevenar®13 (13 serotips de pneumococ-Pn13), autoritzada a partir de les 6 setmanes de vida sense límit superior d'edat i Synflorix® (10 serotips de pneumococ-Pn10), autoritzada a partir de les 6 setmanes de vida fins els 5 anys d'edat.

El pneumococ és un bacteri amb més de 90 serotips. Tot i que la vacuna no protegeix contra tots ells, ho fa contra els més prevalents i els que més infeccions produeixen **en les edats més extremes de la vida** i també en presència d'algunes malalties en què s'altera la immunitat. Aquestes infeccions poden ser greus: meningitis, bacterièmia o pneumònia.

Les vacunes disponibles al mercat són molt segures i eficaces. S'ha d'administrar sempre el mateix preparat comercial en cada dosi.

El calendari de vacunacions sistemàtiques indica i finança la vacunació contra el pneumococ pels infants nascuts a partir del 01/01/2016. També està finançada per a persones de grups de risc específics

Les recomanacions de les societats científiques són segons l'edat d'inici de la vacunació:

Edat	Immunització primària	Intervals mínims entre dosis primàries	Dosi record	Nombre total dosis
6 setmanes a 6 mesos	2 dosis si hi ha calendari sistemàtic (cas de Catalunya) (Pn10/Pn13) 3 dosis si no hi ha calendari sistemàtic (Pn10/Pn13)	1 mes	Sí, als 11-15 mesos Almenys 6 mesos des de l'última dosi	3 si hi ha calendari sistemàtic (cas de Catalunya) 4 si no hi ha calendari sistemàtic



7 a 11 mesos	2 dosis (Pn10/Pn13)	1 mes	Sí, al segon any vida Almenys 2 mesos des de l'última dosi	3
12 a 23 mesos	1 dosi (Pn10/Pn13)		Sí, separades com a mínim per un interval de 2 mesos	2
2 a 5 anys	1 dosi Pn13 1 dosi Pn10		No en VCN13 Sí en VCN10, separades com a mínim per un interval de 2 mesos	1 per Pn13 2 per Pn10
6 a 17 anys	1 dosi Pn13			1
Adults \geq 18 anys i persones d'edat avançada.	1 dosi Pn13			1

Riscos generals

L'administració de qualsevol vacuna pot provocar una reacció local amb envermelliment, edema, dolor i febre.

En molt rares ocasions poden produir una reacció greu que requereixi algun tipus de tractament.

La fitxa tècnica i el prospecte descriuen de forma detallada els efectes adversos específics de cada vacuna.

Precaucions per la conservació de les vacunes

Un cop s'ha rebut la recomanació de vacuna no sistemàtica no finançada, per part d'un professional de la salut, s'ha de comprar a la farmàcia amb el document de prescripció mèdica corresponent. S'ha de transportar en bosses refrigerades evitant el contacte directe amb els acumuladors de fred. No exposar-la a la llum ni a fonts de calor.

S'han de mantenir en nevera entre 2 i 8 graus, no deixar-les a temperatura ambient. Les vacunes no han de tocar la paret posterior de la nevera, i tampoc s'han de guardar a la porta de la nevera. El trencament de la cadena de fred, pot suposar la pèrdua d'efectivitat de la vacuna.

Per saber-ne més:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Pneumonia-00001>

<http://www.vacunas.org/enfermedad-neumococica/>