



Vía de administración de las vacunas

Vías de administración

- *Intramuscular (IM) 90°*
- *Subcutánea (SC) 45°*
- *Intradérmica (ID) 15°*
- *Oral: ingerido*
- *Intranasal: fosas nasales*

Zonas de administración

- *Cara anterolateral del muslo (zona del músculo vasto lateral o externo, que pertenece al músculo cuádriceps)*
- *Parte superior del brazo (zona del músculo deltoides)*
- *Boca*
- *Fosas nasales*

INTRAMUSCULAR (IM)

Difteria-tétanos (dT)
 Difteria-tétanos-pertusis acelular (DTPa y dTpa)
 DTPa-IPV
 DTPa-IPV-Hib
 DTPa-IPV-HepB
 DTPa-IPV-Hib-HepB
 Gripe
 Hepatitis A
 Hepatitis B
 Hepatitis A+B
 Meningitis C
 Meningitis B
 Meningitis A,C,W,Y (conj.)
 Neumococo conjugada
 Polio inyectable
 Rabia
 Triple vírica + varicela: solo PRIORIX® TETRA
 Virus del papiloma humano

INTRAMUSCULAR (IM) o SUBCUTÁNEA (SC)

Encefalitis japonesa
 Fiebre amarilla
 Fiebre tifoidea
 Gripe: excepto FLUARIX®
 TETRA
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
 Herpes Zoster: ZOSTAVAX®
 Neumococo 23 v.
 Triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)
 Triple vírica + varicela (solo PROQUAD®)

INTRANASAL

Gripe: solo FLUENZ TETRA® (No comercializada en España)

SUBCUTÁNEA (SC)

Varicela

INTRADÉRMICA (ID)

BCG

ORAL

Cólera
 Fiebre tifoidea
 Rotavirus

