

Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2016. Pautes de vacunació de rescat.

Taula 1. Pautes de vacunació de rescat (edat d'inici i intervals mínims entre dosis) per a infants menors de 7 anys.

Primera dosi (edat mínima vàlida)	Dosis requerides	Entre primera i segona dosi	Entre segona i tercera dosi	Entre tercera i quarta dosi
<b>DTPa<sup>1,2</sup></b> (6 setmanes)	<b>4</b> (3 si 3a dosi ≥ 4 anys)	<b>4 setmanes</b>	<b>6 mesos</b> <b>3a dosi: Edat mínima 11 mesos.</b> Dosi vàlida si l'interval amb la 2a ≥ 4 mesos.	<b>6 mesos</b> <b>4a dosi: Edat mínima 6 anys.</b> No cal aquesta dosi si la 3a ha estat administrada ≥ 4 anys
<b>Pi<sup>1,3</sup></b> (6 setmanes)	<b>4</b> (3 si 3a dosi ≥ 4 anys)	<b>4 setmanes</b>	<b>6 mesos</b> <b>3a dosi: Edat mínima 11 mesos.</b> Dosi vàlida si l'interval amb la 2a ≥ 4 mesos.	<b>6 mesos</b> <b>4a dosi: Edat mínima 6 anys.</b> No cal aquesta dosi si la 3a ha estat administrada ≥ 4 anys
<b>Hib<sup>1,4</sup></b> (6 setmanes)	<b>Depèn l'edat</b> 3 (< 11 mesos) 2 (12-14 mesos) 1 (≥ 15 mesos)	<b>4 setmanes</b> Si la primera s'administra abans dels 12 mesos <b>8 setmanes</b> , si s'ha vacunat entre els 12 i 14 mesos (No cal més dosis) No cal cap més dosi si 1a dosi posada ≥ 15 mesos d'edat	<b>6 mesos</b> <b>3a dosi: Edat mínima 11 mesos.</b>  No cal cap més dosis  No cal cap més dosi si anterior dosi posada ≥ 15 mesos d'edat	
<b>HB<sup>1,5</sup></b> (naixement)	<b>3</b>	<b>4 setmanes</b>	<b>8 setmanes</b> (i 16 setmanes des de la 1a). <b>Edat mínima 6 mesos</b>	
<b>MC</b> (2 mesos)	<b>Depèn de l'edat i el preparat<sup>6</sup></b>	<b>Pauta 2+1+1: 8 setmanes</b> <b>Pauta 1+1+1: 6 mesos</b> (i ≥ 12 mesos d'edat) Si té ≥ 4 mesos en rebre la 1a dosi no s'administrarà la 2a dosi fins als 12 mesos d'edat  Si té ≥ 12 mesos en rebre la 1a dosi no s'administrarà la 2a dosi fins als 11-12 anys d'edat	<b>Pauta 2+1+1: 6 mesos</b> (i edat ≥ 12 mesos)  <b>Pauta 1+1+1: 6 mesos</b> (i edat ≥ 11 anys)  *Si s'ha rebut alguna dosi a partir dels 10 anys d'edat no caldrà cap més dosi	
<b>XRP</b> (12 mesos)	<b>2</b>	<b>4 setmanes<sup>7</sup></b>		
<b>HA</b> (12 mesos)	<b>2</b>	<b>6 mesos</b> (i edat mínima recomanada 6 anys)		
<b>Varicel.la</b> (12 mesos) <sup>8</sup>	<b>2</b>	<b>3 mesos<sup>8</sup></b> <b>Edat mínima recomanada 15 mesos</b> (i edat mínima recomanada 3 anys)		
<b>PnC</b> (6 setmanes)	<b>Depèn l'edat i el preparat<sup>9</sup></b>  <b>Vacunació sistemàtica:</b> Pauta 2+1  <b>Vacunació grups de risc:</b> Pauta 3+1 més vacuna polisacàridica (en ≥ 2 anys d'edat i al menys 8 setmanes després de la conjugada)	<b>Si la 1a s'administra &lt; 6 mesos edat:</b> <b>Pauta 2+1: 8 setmanes</b> <b>Pauta 3+1: 4 setmanes</b>  <b>Si la 1a s'administra entre 6-11 mesos edat:</b> <b>8 setmanes</b> (i 12 mesos d'edat)  <b>Si la 1a s'administra &gt; 12 mesos d'edat:</b> No cal cap més dosis, excepte en els grups de risc de 12-59 mesos que han de rebre 2a dosis separada 8 setmanes.	<b>Pauta 2+1: 8 setmanes</b> i ≥ 11 mesos d'edat <b>Pauta 3+1: 4 setmanes</b>	<b>Pauta 3+1: 8 setmanes</b> i ≥ 11 mesos d'edat
<b>RV*</b> (6 setmanes)	<b>2 o 3</b> <b>Depèn del preparat</b>	<b>4 setmanes</b> Cal administrar la darrera dosi abans de les 24 setmanes d'edat	<b>4 setmanes</b> Cal administrar la darrera dosi abans de les 32 setmanes d'edat	
<b>Grip*</b> (6 mesos)	<b>1 o 2<sup>10</sup></b>	<b>4 setmanes</b>		
<b>MB4*</b> (2 mesos)	<b>Vacunació grups de risc</b> Depèn de l'edat tant el nombre de dosis com els intervals entre elles			
	2-5 mesos: 4 dosis	<b>4 setmanes</b>	<b>4 setmanes</b>	<b>8 mesos</b> (i 12-15 mesos d'edat)
	6-11 mesos: 3 dosis	<b>8 setmanes</b>	<b>8 setmanes</b> (a partir dels 12 mesos d'edat)	
	12-23 mesos: 3 dosis	<b>8 setmanes</b>	<b>12 mesos</b>	
	2-7 anys: 2 dosis	<b>8 setmanes</b>		

\* Vacunes no sistemàtiques (o no sistemàtiques en aquesta franja d'edat), poden estar indicades en grups de risc.

1. Si s'han d'administrar les vacunes DTPa, PI, Hib i HB es farà amb la vacuna combinada hexavalent (DTPa-Hib-PI-HB).
2. DTPa: la quarta dosi no és necessària si la tercera ha estat administrada després de fer els 4 anys. A partir dels 4 anys es pot administrar la vacuna dTpa.
3. PI: la quarta dosi no és necessària si la tercera ha estat administrada després de fer els 4 anys.
4. Hib: no es recomana sistemàticament als infants més grans de 5 anys. Les dosis necessàries depenen del moment de l'inici de la vacunació: durant el primer any de vida es recomanen 3 dosis; si es comença entre els 12 i els 15 mesos cal una dosi de reforç passades almenys 8 setmanes; a partir dels 15 mesos només cal una dosi (No importa administrar dosis suplementàries de Hib si es dona com a component de la vacuna hexavalent).
5. HB: la pauta recomana actual és al 2, 4 i 11 mesos com a component de la vacuna hexavalent. En fills de portadora administrar 1 dosi d'HB monocomponent al néixer i les 3 dosis addicionals d'hexavalent.
6. MC: Les recomanacions poden variar segons la vacuna utilitzada. Pauta 2+1+1: dues dosis en el primer any de vida (a partir dels dos mesos i separades almenys dos mesos), preferentment als 2 i 4 mesos d'edat.. Pauta 1+1+1: una dosi abans dels 12 mesos, a partir dels 4 mesos d'edat. Continuació amb una dosi a partir del primer any (independentment de les dosis rebudes durant el primer any de vida) preferentment als 12 mesos d'edat i una dosi als 11-12 anys.
7. XPR: la segona dosi es recomana als 3 o 4 anys, però si s'administra abans d'aquesta edat no cal posar-la de nou si ha estat administrada abans d'aquesta edat i almenys un mes després de la primera.
8. Varicel·la: Fins als 12 anys l'interval recomanat és de 3 mesos, però es pot considerar vàlid un interval de només 4 setmanes. Si la vacuna s'administra entre els 9 i els 12 mesos, amb una dosi posterior separada almenys 3 mesos i després dels 12 mesos d'edat es considerarà finalitzada la pauta.
9. PnC. Nombre de dosis segons edat d'inici. Pauta 2+1: 3 en <6 mesos; 2 entre 6-11 mesos; 1 en ≥12 mesos. Pauta 3+1 en grups de risc (immunodeprimits): 4 en < 6 mesos; 3 entre 7-11 mesos; 2 entre 12-59 mesos; 1 en >59 mesos. Synflorix està autoritzada fins als 5 anys; Prevenar 13 no hi ha límit d'edat.
10. Els infants entre 6 mesos i 8 anys d'edat han de rebre dues dosis separades 4 setmanes la primera temporada que són vacunats.

Una dosi de vacuna administrada 5 o més dies abans de l'edat mínima s'ha de repetir (dosi no vàlida) quan l'infant tingui l'edat mínima i 4 o més setmanes després de la dosi invalidada.

Una dosi de vacuna administrada 4 o menys dies abans de l'interval mínim es comptabilitzarà com a vàlida. Una dosi administrada 5 o més dies abans de l'interval mínim no comptabilitzarà com a vàlida i es repetirà la dosi transcorregut l'interval mínim recomanat després de la dosi invalidada.