

Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2016. Pautes de vacunació de rescat

Taula 2. Pautes de vacunació de rescat, dosis i intervals mínims entre dosis, de 7 a 18 anys, ambdós inclosos

Vacuna	Dosis requerides ¹	Interval entre primera i segona dosi	Interval entre segona i tercera dosi
Td/dTpa ²	3	4 setmanes	6 mesos
PI	3	4 setmanes	6 mesos
HB*	3	4 setmanes	8 setmanes (i 16 setmanes des de la primera)
HA*	2	6 mesos	No necessària
HAB*	3	4 setmanes	5 mesos
XRP	2	4 setmanes	No necessària
MC	1-2 ³	4 setmanes	No necessària
Varicel·la	2	12 setmanes <13 anys ⁴ 4 setmanes ≥13 anys	No necessària
VPH	2-3 ⁵	4 setmanes ⁵ (6 mesos pauta 2 dosis)	12 setmanes ⁵
Grip #	1/any ⁶	Vacunació anual	Vacunació anual
Pn23 #	2	5 anys (només grups d'alt risc) No indicada en immunocompetents fins als 65 anys	No indicada
Pn13 #	1	No indicades més dosis excepte TPH	No indicada excepte TPH
MB4 #	2	8 setmanes (≤ 10 anys) 4 setmanes (> 10 anys)	

En persones parcialment vacunades abans dels 7 anys, quan es continuï la vacunació a partir del 7 anys, caldrà tenir en compte les dosis administrades prèviament i l'edat al rebre les vacunes.

1. Dosis requerides per una immunització correcta en persones sense vacunacions prèvies.

2. Td/dTpa: Els vacunats amb 1-2 dosi abans dels 12 mesos d'edat rebran 3 dosis de Td (una de les quals pot ser substituïda per dTpa). Els vacunats amb 1 dosi després dels 12 mesos d'edat rebran 2 dosis de Td (una de les quals pot ser substituïda per dTpa). La utilització d'una dosi de vacuna dTpa es considera vàlida en substitució d'una Td de qualsevol de les 3 dosis de primovacunació o dosis de reforç. En les dones embarassades està indicada una dosi de dTpa en cada embaràs, preferentment entre les 27 i 36 setmanes de gestació.

3. MC: No vacunats <10 anys: 1 dosi seguida d'una altra als 11-12 anys d'edat; en ≥ 10 anys: dosi única, en els >12 anys que han rebut una dosi de reforç entre els 5 i 9 anys d'edat i amb un interval de 10 anys.

4. Varicel·la: En els menors de 13 anys es recomana un interval mínim de 12 setmanes entre les dues dosis, però es considerarà vàlid si ≥ 4 setmanes.

5. VPH: La vacunació sistemàtica contra el VPH es pot fer amb pauta de dues dosis separades 6 mesos, en les noies de 9 a 13 anys (per a la vacuna tetravalent -VPH4-) i de 9 a 14 anys (per a la vacuna bivalent -VPH2-). A partir d'aquesta edat es recomana una pauta de 3 dosis (0, 1-2 i 6 mesos). Entre la primera i la tercera dosi cal un interval mínim de 24 setmanes.

6. Els menors de 9 anys d'edat han de rebre dues dosis separades 4 setmanes la primera temporada que són vacunats.

* Si cal administrar les dues vacunes es recomana fer servir vacuna combinada HA+B (3 dosis).

Vacunes no sistemàtiques. Recomanades en persones amb patologies de risc. Consultar protocols específics.

Una dosi de vacuna administrada 5 o més dies abans de l'edat mínima s'ha de repetir (dosi no vàlida) quan l'infant tingui l'edat mínima i 4 o més setmanes després de la dosi invalidada.

Una dosi de vacuna administrada 4 o menys dies abans de l'interval mínim es comptabilitzarà com a vàlida. Una dosi administrada 5 o més dies abans de l'interval mínim no comptabilitzarà com a vàlida i es repetirà la dosi transcorregut l'interval mínim recomanat després de la dosi invalidada.