

Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2016. Pautes de vacunació de rescat.

Taula 4. Edat i intervals recomanats i mínims per administrar les vacunes sistemàtiques per cada dosi

Vacuna i número de dosi	Edat recomanada per la dosi	Edat mínima per la dosi	Interval recomanat següent dosi	Interval mínim següent dosi
DTPa 1	2 mesos	6 setmanes	2 mesos	4 setmanes
DTPa 2	4 mesos	10 setmanes	6 mesos	4 mesos
DTPa 3	11 mesos	11 mesos	5 anys	6 mesos
DTPa 4	6 anys	4 anys	8 anys amb la Td dels 14 anys	1 any#
PI 1	2 mesos	6 setmanes	2 mesos	4 setmanes
PI 2	4 mesos	10 setmanes	6 mesos	4 mesos
PI 3	11 mesos	11 mesos	5 anys	6 mesos
PI 4	6 anys	4 anys	Es recomana una única dosi addicional a les persones >4 anys d'edat (vacunades abans) que viatgin a zona endèmica	
Hib 1	2 mesos	6 setmanes	2 mesos	4 setmanes
Hib 2	4 mesos	10 setmanes	6 mesos	4 mesos
Hib 3	11 mesos	11 mesos		
HB 1	2 mesos	Al neixer (vacuna HB monovalent)	2 mesos	4 setmanes
HB 2	4 mesos	4 setmanes	6 mesos	4 mesos
HB 3	11 mesos	11 mesos		
PnC 1	2 mesos	6 setmanes	2 mesos	2 mesos
PnC 2	4 mesos	14 setmanes	2 mesos	2 mesos (i ≥11 mesos d'edat)
PnC 3	11 mesos	11 mesos		
HA 1	15 mesos	12 mesos	5 anys	6 mesos
HA 2	6 anys	18 mesos	També es vacunarà als 11-12 anys fins que les cohorts vacunades arribin a aquesta edat	
MC 1 ^{&}	4 mesos	4 mesos	8 mesos	6 mesos (i > 12 mesos d'edat)
MC 2	12 mesos	12 mesos	9 anys	
MC 3 ⁺	11-12 anys	10 anys		
XRP 1	12 mesos	9 mesos (caldrà repetir-la ≥12 m)	2-3 anys	4 setmanes
XRP 2	3 anys	13 mesos		
Varicel.la 1	15 mesos	12 mesos (excepcionalment 9 m)	2 anys	4 setmanes (en < 13 anys es recomanen 12 setmanes)
Varicel.la 2	3 anys	13 mesos	També es vacunarà als 11-12 anys fins que les cohorts vacunades arribin a aquesta edat	
VPH 1	11-12 anys	9 anys	≥6 mesos	6 mesos, si és inferior cal administrar 3 dosis (4 setmanes per pauta de 3 dosis)
VPH 2	11-12 anys (+6 mesos)	9 anys (6 mesos)	En noies >13 o >14 anys* cal pauta de 3 dosis (12 setmanes per pauta de 3 dosis)	
Td	14, 40 i 65 anys	7 anys	>10 anys	Veure pautes de primovacunació recomanades en no vacunats amb anterioritat
GRIP	≥60 anys	6 mesos (en els grups de risc)	Administrar cada temporada	Administrar cada temporada
Pn23	≥65 anys (vac sistemàtica)	2 anys (grups de risc)	>5 anys (grups de risc)	5 anys (No repetir si l'interval és inferior)

L'interval mínim significa que si per alguna raó s'ha administrat una dosi abans de l'interval recomanat, aquesta dosi es pugui considerar vàlida en substitució de la que caldria administrar trascorregut l'interval recomanat i no calgui repetir-la.

La següent dosi recomanada és la Td als 14 anys. Si, a partir dels 7 anys, per error s'avança aquesta vacunació amb un interval de més d'un any respecte de la DTP/dTpa dels 6 anys no caldrà administrar-la als 14 anys.

& La pauta depèn de l'edat d'inici i del preparat vacunal. Edat d'inici entre els 2-4 mesos: 2 dosis, als 2 i 4 mesos; edat d'inici > 4 mesos, adolescents i adults: 1 dosi. Revacunació segon any de vida i als 12 anys d'edat.

+ En els majors de 12 anys que han rebut una dosi de reforç entre els 5 i 9 anys d'edat administrar una dosi addicional amb un interval de 10 anys.

* La vacunació sistemàtica contra el VPH es pot fer amb pauta de dues dosis, en les noies de 9 a 13 anys (per a la vacuna tetravalent -VPH4-) i de 9 a 14 anys (per a la vacuna bivalent -VPH2-). A partir d'aquesta edat es recomana una pauta de 3 dosis (0, 1-2 i 6 mesos).