

Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2016. Pautes de vacunació de rescat.

Taula 3. Pautes de vacunació de rescat, dosis i intervals mínims entre dosis, per majors de 18 anys.

Vacunes	Dosis requerides ¹	Entre primera i segona dosi	Entre segona i tercera dosi
Td/dTpa ²	3 ³	4 setmanes	6 mesos
XRP	2	4 setmanes	No necessària
Grip ^{4,#}	1/any	Vacunació anual	Vacunació anual
Pn23 ^{4,#}	1-2 ⁵	5 anys (només grups d'alt risc) En immunocompetents a partir dels 65 anys d'edat.	No indicada
Pn13 [#]	1	No indicades més dosis excepte TPH	No indicada excepte TPH
HB ^{#,*}	3	4 setmanes	8 setmanes (i 16 setmanes des de la primera)
HA ^{#,*}	2	6 mesos	No necessària
HAB [*]	3	4 setmanes	5 mesos
MC ⁶	1	No necessària	No necessària
Varicel·la ^{7,#}	2	4 setmanes	No necessària
VPH ⁸	3	4 setmanes	12 setmanes
PI ^{9,#}	3	4 setmanes	6 mesos
MB4 #	2	4 setmanes	

- Dosis requerides per una immunització correcta en persones sense vacunacions prèvies.
 - La utilització d'una dosi de vacuna dTpa es considera vàlida en substitució d'una Td de qualsevol de les 3 dosis de primovacunació o dosis de reforç. En les dones embarassades està indicada una dosi de dTpa en cada embaràs, preferentment entre les setmanes 27 i 36 setmanes de gestació. En les persones amb VIH es recomana la revacunació amb Td cada 10 anys.
 - Després de la primovacunació es recomana administrar fins a 2 dosis de reforç amb un interval d'almenys 10 anys. Aquestes dosis de reforç es recomanen als 40 i 65 anys al calendari de Catalunya.
 - Vacunació sistemàtica per les persones ≥ 65 anys d'edat.
 - Si es comença a vacunar a partir dels 65 anys només es recomana 1 dosi.
 - Població general, recomanada fins als 20 anys. Persones amb VIH positiu, fins als 25 anys.
 - Recomanada als adults susceptibles, verificat amb serologia negativa.
 - Recomanada a les dones fins als 26 anys amb VIH i dones conitzades per alteracions de CIN2+. Entre la primera i la tercera dosi cal un interval mínim de 24 setmanes.
 - En situacions de risc, els ja vacunats solament necessiten una única dosi de reforç en tota la vida.
- * Si cal administrar les dues vacunes es recomana fer servir vacuna combinada HAB.
- # Vacunes recomanades en persones amb conductes i/o patologies de risc. Consultar protocols específics.

Una dosi de vacuna administrada 5 o més dies abans de l'edat mínima s'ha de repetir (dosi no vàlida) quan es tingui l'edat mínima i 4 o més setmanes després de la dosi invalidada.

Una dosi de vacuna administrada 4 o menys dies abans de l'interval mínim es comptabilitzarà com a vàlida. Una dosi administrada 5 o més dies abans de l'interval mínim no comptabilitzarà com a vàlida i es repetirà la dosi transcorregut l'interval mínim recomanat després de la dosi invalidada.