


Dreta

Esquerra

(IM). Intramuscular
(SC). Subcutània


2 mesos

PNC (IM) → ← HEXA (IM)




4 mesos

PNC (IM) → ← HEXA (IM)
MC (IM)



11 mesos


PNC (IM) → ← HEXA (IM)



12 mesos


XRP (SC) → ← MC (IM)

MC (IM)
Opcional




15 mesos

HA (IM) → ← V (SC)




3 anys

XRP (SC) → ← V (SC)




6 anys

VHA (IM) → ← dTpa PI (IM)



11 - 12 anys


HA (IM) → ← VPH (IM)
V (SC) → ← MC (IM)



A l'escola es recomana no administrar més de dues vacunes en cada visita.


Dones embarassades

Grip (IM) → ← dTpa (IM)



Adults > 60 anys

Grip (IM) → ← Pn23 o Pn13 (IM)
Td (IM) → ← VZ (SC)



Es poden administrar amb immunoglobulina anti-D

Es recomana no administrar més de dues vacunes per visita per evitar reaccions locals

En cada acte de vacunació s'han de seguir rutines estàndard pel que fa a les vacunes a administrar, la zona anatòmica i la lateralitat, sobretot quan s'han d'administrar diverses vacunes.

- El procediment s'ha de registrar, de manera que es pugui identificar la vacuna en cas de reacció local.
- Quan s'administren dues vacunes en una mateixa zona anatòmica cal separar-les entre 2'5 – 3 cm.
- Les vacunes s'han d'administrar seguint un ordre determinat i deixar per al final les més doloroses:

□ vacuna pneumococccica conjugada, vacuna contra el VPH,...