



## Informació de les vacunes no finançades, no incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut . Generalitat de Catalunya

### Vacuna contra el meningococ B

---

El Departament de Salut indica i finança les vacunes incloses en el Calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçades a tota la població, i també aquelles que estan indicades en situacions de risc de manera individual.

Alguns clínics i societats científiques fan recomanacions de vacunes fora de les indicacions oficials. Aquestes vacunes no estan finançades i necessiten la prescripció mèdica per ser administrades.

### Vacunes disponibles

---

El bacteri *Neisseria meningitidis*, conegut també com a meningococ, és la principal causa de la malaltia invasiva greu en l'edat pediàtrica, de meningitis bacterianes i sèpsies, i d'altres infeccions menys greus. Hi ha diferents serogrupos de meningococ. En el calendari vacunal sistemàtic es vacuna contra el serogrup C des de l'any 2000 (MC).

El calendari de vacunacions sistemàtiques inclou la vacunació contra la infecció produïda pel meningococ del serogrup C. No inclou vacunes contra altres serogrupos, com ara el serogrup B. Actualment hi ha disponibles dues vacunes contra el meningococ B: Bexsero® (MB4) i Trumenba® (recombinant) que han demostrat la seva eficàcia i seguretat.

Existeixen protocols específics del Departament de Salut per a grups de risc. Les persones pertanyents als grups de risc reben aquestes vacunes de forma gratuïta,

**Trumenba®** està autoritzada a partir dels 10 anys d'edat

Pauta de vacunació:

Hi ha dues pautes de vacunació. L'elecció de la pauta dependrà del risc a l'exposició i a la susceptibilitat del pacient a la malaltia meningocòccica per serogrup B.

- Pauta de 2 dosis: separades entre elles de 6 mesos
- Pauta de 3 dosis: la segona, almenys 1 mes després de la primera i la tercera almenys 4 mesos després de la segona

**Bexsero®** està autoritzada a partir dels dos mesos d'edat i no hi ha dades sobre el seu ús en adults majors de 50 anys. És freqüent que pugui ocasionar efectes adversos lleus. Pot produir febre (habitualment baixa: 38 – 38.5°C) en les primeres hores i pot durar 24 hores, per aquest motiu es recomana administrar-la sola. La pauta de vacunació varia en funció de l'edat d'inici.



<i>Edat primera dosi</i>	<i>Immunització primària</i>	<i>Intervals mínims entre dosis primàries</i>	<i>Dosis record</i>	<i>Nombre total dosis</i>
2 a 5 mesos	3 dosis	1 mes	Sí, als 12-15 mesos	4
3 a 5 mesos	2 dosis	2 mesos	Sí, als 12-15 mesos	3
6 a 11 mesos	2 dosis	2 mesos	Sí, al segon any vida. Interval mínim de 2 mesos entre la dosi final de primovacunació i la dosi de reforç	3
12 a 23 mesos	2 dosis	2 mesos	Sí, al cap de 12-23 mesos	3
2 a 10 anys	2 dosis	2 mesos	No	2
Més 11 anys i adults fins 50 anys	2 dosis	1 mes	No	2

### **Riscos generals**

---

L'administració de qualsevol vacuna pot provocar una reacció local amb envermelliment, edema, dolor i febre.

En molt rares ocasions poden produir una reacció greu que requereixi algun tipus de tractament.

La fitxa tècnica i el prospecte descriuen de forma detallada els efectes adversos específics de cada vacuna.

### **Precaucions per la conservació de les vacunes**

---

Un cop s'ha rebut la recomanació de vacuna no sistemàtica no finançada, per part d'un professional de la salut, s'ha de comprar a la farmàcia amb el document de prescripció mèdica corresponent.

La vacuna cal mantenir-la a la nevera, a una temperatura entre 2 i 8 graus, i no deixar-les a temperatura ambient. Les vacunes no poden tocar la paret posterior de la nevera, i tampoc s'han de guardar a la porta de la nevera. S'ha de transportar en bosses refrigerades evitant el contacte directe amb els acumuladors de fred, que no poden estar congelats.

No exposar-la a la llum ni a fonts de calor.

El trencament de la cadena de fred, pot suposar la pèrdua d'efectivitat de la vacuna.

Per saber-ne més:

[http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia\\_meningococica](http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia_meningococica)

<http://www.vacunas.org/enfermedad-meningococica/>