



Informació de les vacunes no finançades, no incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut . Generalitat de Catalunya

Vacuna contra el rotavirus.

El Departament de Salut indica i finança les vacunes incloses en el Calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçades a tota la població, i també aquelles que estan indicades en situacions de risc de manera individual.

Alguns clínics i societats científiques fan recomanacions de vacunes fora de les indicacions oficials. Aquestes vacunes no estan finançades i necessiten la prescripció mèdica per ser administrades.

Vacunes disponibles

El rotavirus és una de les principals i més freqüents causes de diarrea en els primers anys de vida i afecta sobretot als nens menors de 5 anys. Les vacunes disponibles han demostrat la seva seguretat i eficàcia.

Estan comercialitzades a Espanya dues vacunes Rotateq® i Rotarix®

- Rotateq®: rotavirus tipus G1, G2, G3, G4, P1A humà-bovins (virus vius)

S'administren 3 dosis per via oral. La primera dosi s'ha d'administrar entre les 6 i les 12 setmanes de vida i l'última abans de les 32 setmanes separades com a mínim 4 setmanes entre elles.

Edat	Immunització primària	Intervals mínims entre dosis primàries	Dosis record
6 setmanes a 32 setmanes	3 dosis	4 setmanes	No

- Rotarix®: Soca rotavirus humà RIX4414 (virus atenuats)

S'administren 2 dosis per via oral. La 2ª dosi preferentment abans de les 16 setmanes, i en tot cas la vacunació ha d'estar finalitzada a les 24 setmanes.

Edat	Immunització primària	Intervals mínims entre dosis primàries	Dosis record
6 setmanes a 24 setmanes	2 dosis	4 setmanes	No



Riscos generals

Es recomana que l'administri un professional sanitari, exclusivament per via oral (beguda).

La seva administració pot provocar reaccions al·lèrgiques a qualsevol dels seus components.

Altres reaccions adverses descrites, totes elles lleus son: irritabilitat, febre, vòmits o diarrea.

En molt rares ocasions poden produir una reacció greu que requereixi algun tipus de tractament.

La fitxa tècnica i el prospecte descriuen de forma detallada els efectes adversos específics de cada vacuna.

Precaucions per la conservació de les vacunes

Un cop s'ha rebut la recomanació de vacuna no sistemàtica no finançada, per part d'un professional de la salut, s'ha de comprar a la farmàcia amb el document de prescripció mèdica corresponent. S'ha de transportar en bosses refrigerades evitant el contacte directe amb els acumuladors de fred. No exposar-la a la llum ni a fonts de calor.

S'han de mantenir en nevera entre 2 i 8 graus, no deixar-les a temperatura ambient. Les vacunes no han de tocar la paret posterior de la nevera, i tampoc s'han de guardar a la porta de la nevera. El trencament de la cadena de fred, pot suposar la pèrdua d'efectivitat de la vacuna. Aquesta vacuna sempre te que ser administrada per un professional sanitari.

Per saber-ne més:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Rotavirus>

<http://www.vacunas.org/rotavirus-2/>