



Informació de les vacunes no finançades, no incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut . Generalitat de Catalunya

Vacuna contra el virus papiloma humano (VPH).

El Departament de Salut indica i finança les vacunes incloses en el Calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçades a tota la població, i també aquelles que estan indicades en situacions de risc de manera individual.

Alguns clínics i societats científiques fan recomanacions de vacunes fora de les indicacions oficials. Aquestes vacunes no estan finançades i necessiten la prescripció mèdica per ser administrades.

Vacunes disponibles

Gardasil® (4 serotips-VPH4), **Gardasil® 9** (9 serotips-VPH9) i **Cervarix®** (2 serotips-VPH2).

El VPH és un virus comú que es propaga a través del contacte sexual. N'hi ha de molts tipus diferents i molts d'ells no causen problemes, però algunes soques poden produir càncer de coll d'úter i berrugues genitals. La vacuna contra el VPH protegeix contra serogrupos de VPH que causen la majoria de càncers de coll de l'úter. Contra 2 en el cas de Cervarix® i Gardasil® i 7 en el cas de Gardasil®9, La vacuna Gardasil® i Gardasil®9 a més protegeix de les berrugues genitals. El VPH també és el responsable d'una important part de certa patologia oncològica pròpia de l'home (càncer de penis) o de tots dos sexes, com el càncer d'anus, de gola, etc si bé per a aquests últims és més freqüent en el sexe masculí.

Segons el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya es recomana que les noies d'11-12 anys rebin dos dosis de vacuna amb un interval de 6 mesos entre elles. Aquesta vacuna es recomana y finança tambe a dones y homes que pertanyen a certs grups de risc. (pregunti al seu metge o infermera). En la resta de casos la vacuna del VPH és una vacuna no sistemàtica i no finançada.

Les recomanacions de les societats científiques són:

- o **Gardasil®** (4 serotips- VPH4)

<i>Edat</i>	<i>Sexe</i>	<i>Immunització primària</i>	<i>Intervals entre dosis</i>
9 a 13 anys	Dona	2 dosis	0-6 mesos
9 a 13 anys	Home	2 dosis	0-6 mesos
14 a 45 anys	Dona	3 dosis	0-2-6 mesos
14 a 26 anys	Home	3 dosis	0-2-6 mesos





- **Gardasil®9** (9 serotips- VPH4)

<i>Edat</i>	<i>Sexe</i>	<i>Immunització primària</i>	<i>Intervals entre dosis</i>
9 a 14 anys	Dona	2 dosis	0-6 mesos
9 a 14 anys	Home	2 dosis	0-6 mesos
15 a 45 anys	Dona	3 dosis	0-2-6 mesos
15 a 26 anys	Home	3 dosis	0-2-6 mesos

- **Cervarix®** (2 serotips- VPH2)

<i>Edat</i>	<i>Sexe</i>	<i>Immunització primària</i>	<i>Intervals entre dosis</i>
9 a 14 anys	Dona	2 dosis	0-6 mesos
15 – 55 anys	Dona	3 dosis	0-1-6 mesos

Riscos generals

L'administració de qualsevol vacuna pot provocar una reacció local amb envermelliment, edema, dolor i febre.

En molt rares ocasions poden produir una reacció greu que requereixi algun tipus de tractament.

La fitxa tècnica i el prospecte descriuen de forma detallada els efectes adversos específics de cada vacuna.

Precaucions per la conservació de les vacunes

Un cop s'ha rebut la recomanació de vacuna no sistemàtica no finançada, per part d'un professional de la salut, s'ha de comprar a la farmàcia amb el document de prescripció mèdica corresponent. S'ha de transportar en bosses refrigerades evitant el contacte directe amb els acumuladors de fred. No exposar-la a la llum ni a fonts de calor.

S'han de mantenir en nevera entre 2 i 8 graus, no deixar-les a temperatura ambient. Les vacunes no han de tocar la paret posterior de la nevera, i tampoc s'han de guardar a la porta de la nevera. El trencament de la cadena de fred, pot suposar la pèrdua d'efectivitat de la vacuna.

Per saber-ne més:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Papilloma_huma

<http://www.vacunas.org/virus-del-papiloma-humano/>