



Informació de les vacunes no finançades, no incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut . Generalitat de Catalunya

Vacuna contra el virus de la varicel·la.

El Departament de Salut indica i finança les vacunes incloses en el Calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçades a tota la població, i també aquelles que estan indicades en situacions de risc de manera individual.

Alguns clínics i societats científiques fan recomanacions de vacunes fora de les indicacions oficials. Aquestes vacunes no estan finançades i necessiten la prescripció mèdica per ser administrades.

Vacunes disponibles

La varicel·la és una malaltia que afecta a 400.000 persones l'any a l'Estat espanyol, i suposa una mitjana de 1.500 hospitalitzacions. És més freqüent en els primers anys de vida.

Segons el calendari de vacunacions sistemàtiques es recomanen dues dosis pels infants nascuts a partir de l'1 de gener de 2016, administrades als 15 mesos i als 3 anys d'edat. Pels infants nascuts abans d'aquesta data està contemplada la vacunació sistemàtica als 11-12 anys, si no s'han immunitzat de forma natural. Fins que tinguin aquesta edat, l'administració de la vacuna és no sistemàtica i si no hi ha cap altre factor de risc, tampoc finançada.

Estan comercialitzades dues vacunes: Varilrix® i Varivax®. Autoritzades per a la immunització a partir dels 12 mesos d'edat. No existeixen dades de l'eficàcia protectora ni de la resposta immune en persones seronegatives majors de 65 anys

<i>Edat</i>	<i>Nombre de dosis requerides</i>	<i>Interval mínim entre la 1a i 2a dosis</i>	<i>Interval recomanat entre la 1a i 2a dosis</i>
1 a 12 anys	2	4 setmanes	12 setmanes

Riscos generals

L'administració de qualsevol vacuna pot provocar una reacció local amb envermelliment, edema, dolor i febre.

En molt rares ocasions poden produir una reacció greu que requereixi algun tipus de tractament.

La fitxa tècnica i el prospecte descriuen de forma detallada els efectes adversos específics de cada vacuna.



Precaucions per la conservació de les vacunes

Un cop s'ha rebut la recomanació de vacuna no sistemàtica no finançada, per part d'un professional de la salut, s'ha de comprar a la farmàcia amb el document de prescripció mèdica corresponent. S'ha de transportar en bosses refrigerades evitant el contacte directe amb els acumuladors de fred. No exposar-la a la llum ni a fonts de calor.

S'han de mantenir en nevera entre 2 i 8 graus, no deixar-les a temperatura ambient. Les vacunes no han de tocar la paret posterior de la nevera, i tampoc s'han de guardar a la porta de la nevera. El trencament de la cadena de fred, pot suposar la pèrdua d'efectivitat de la vacuna.

Per saber-ne més:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Varicella>

<http://www.vacunas.org/varicela-2/>