

L'autocura és la responsabilitat que cada persona té per al foment, conservació i cura de la seva salut. En aquesta fitxa de salut, et donem la informació necessària perquè realitzis el monitoratge de la pressió arterial de manera correcta i es faci una bona lectura de la teva pressió arterial.

Què és el MAPA? també anomenat **Holter de pressió arterial (PA)** és el monitoratge automàtic de la **PA durant 24 hores** seguides, dia i nit, a través d'un aparell que grava les xifres de PA per a, posteriorment, ser analitzades per la infermera o metge de família.

El MAPA és un **mètode utilitzat tant pel diagnòstic** com per al **control de la hipertensió arterial (HTA)** de difícil control i per valorar la resposta al tractament antihipertensiu

L'HTA es defineix com l'elevació de les xifres de PAS ≥ 140 i/o PAD ≥ 90 mmHg.

Però el **diagnòstic d'HTA mitjançant MAPA** es fa a partir d'altres valors de referència segons la mitjana de les PA mesurades en les 24 hores, en el tram diürn o el nocturn:

- Període **24 hores** $\geq 130 / 80$ mmHg
- Període **diürn** $\geq 135 / 85$ mmHg
- Període **nocturn** $\geq 120 / 70$ mmHg

PAS: Pressió Arterial Sistòlica (màxima).

PAD: Pressió Arterial Diastòlica (mínima).

\geq : Major o igual.

Preparació:

- Acudeixi al centre amb camisa de màniga curta o llarga ampla.
- Si preneu medicació, cal prendre-la com habitualment la pren.
- No cal venir en dejú.
- A la visita se li demanarà l'hora en què va a dormir i en la que s'acostuma llevar.

Funcionament i procediment de l'aparell:

- Consisteix en un petit aparell que portareu penjant en bandolera i connectat a un manegot al braç no dominant.
- Evitar el contacte directe de l'aparell amb la pell.
- Mentre porti l'aparell **no es podrà dutxar o banyar** ja que no es pot mullar.
- El **tub negre del manegot** haurà d'estar sempre **sobre la flexura del colze** per tal que pugui medir correctament la PA. Comprovar periòdicament que està ben posat tal com mostra la imatge.
- L'aparell és silenciós i funciona tant de dia com de nit.

- Generalment, **durant el dia farà la medicació cada 20 minuts i durant la nit cada 30 minuts.**



Consideracions a tenir en compte:

- Durant la medicació, i sempre que sigui possible, mirar d'estirar el braç per una correcta mesura de la PA, així com no parlar. Si us trobeu a casa, mirar, d'asseure en una cadira i estirar el braç damunt de la taula, a l'alçada del cor. Durant la nit, no cal estar pendent, es té tendència a estirar el braç mentre es dorm. Pot dormir de cara amunt o de costat, es podrà ajustar la bandolera d'una manera o altra.
- Si no s'ha pogut fer la mesura de la PA, l'aparell ho intentarà de nou en uns minuts.
- **L'aparell no s'ha de manipular.** Ara bé, si en algun moment us trobéssiu malament, podríeu fer una mesura de la PA de manera manual. La infermera li ensenyarà com fer-ho.
- Durant el dia es pot **fer vida normal**. Se li demanarà que anoti al **diari** algunes situacions al llarg del dia que poden modificar la PA, com l'hora en què fa **exercici físic** o alguns **moments de més estrès**, o el moment d'**anar-se'n a dormir** i **aixecar-se al dia següent**. Registri també els **síntomes** que noti (exemple: dolor, mareig, palpitations),

Si necessita més informació consulti a la seva infermera familiar i comunitària.

