



Què cal saber sobre la vacuna contra la COVID-19 que m'administraran?



Totes les vacunes autoritzades per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) **són segures i efectives** per a la prevenció de la COVID-19.

Actualment estan disponibles quatre vacunes:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna/Lonza, Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) i Johnson&Johnson /Janssen.

Abans d'aprovar-ne l'ús, aquestes vacunes han estat **avaluades de manera rigorosa i científica per l'EMA** mitjançant un procediment que garanteix que compleixen els estrictes requisits de qualitat, seguretat i eficàcia necessaris. Atès que s'administren a persones sanes, el grau d'exigència per autoritzar-les és molt alt i els beneficis són molt superiors als seus riscos.

Malgrat són diferents, totes protegeixen contra la COVID-19 greu. Totes han estat avaluades per separat i no s'han comparat entre elles.

Aquestes vacunes tenen un bon perfil de seguretat i la majoria de les reaccions adverses que poden aparèixer són lleus.

En funció de la seva disponibilitat i del context de la pandèmia, se us oferirà la vacuna més adient.

Seguiment de la seguretat de les vacunes

Les vacunes contra la COVID-19 estan sotmeses a un seguiment permanent dels sistemes de farmacovigilància per assegurar que en tot moment els beneficis superen els riscos. L'EMA, de forma coordinada amb les agències reguladores nacionals, revisa i avalua la nova informació que es genera amb el seu ús. Es fa una anàlisi dels esdeveniments adversos notificats després de la vacunació i es treballa amb altres reguladors i investigadors internacionals per compartir informació sobre seguretat.

En cas d'identificar una nova reacció adversa, l'**EMA emet recomanacions per minimitzar i prevenir els riscos.**

Fins ara, els sistemes de farmacovigilància han identificat una reacció adversa molt rara de trombosi greu amb trombocitopènia (xifra de plaquetes baixa) després de l'administració de les vacunes d'Oxford/AstraZeneca i Janssen. Segons la informació disponible fins ara, el risc després de la primera dosi de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca és de 14 casos per milió de vacunats, i d'1 cas per milió després de la segona dosi.

Amb la vacuna de Johnson&Johnson/Janssen, als Estats Units, amb més experiència d'ús amb aquesta vacuna, s'ha observat que la probabilitat de presentar una trombosi greu amb trombocitopènia és de 2-3 casos per milió de persones vacunades.

Per controlar la pandèmia és molt important vacunar amb la pauta completa el màxim de persones, en el menor temps possible.

No deixeu passar l'oportunitat de vacunar-vos.

La millor decisió és fer-ho amb la vacuna contra la COVID-19 que se us ofereixi i de seguida que se us citi.

Informa-te'n



al teu centre de salut

061 /Salut Respon

trucant al 061



canalsalut.gencat.cat



Si tens dubtes

1 / És molt important que triïs **fonts d'informació fiables.**

2 / Protegeix-te de les **notícies falses** i no les comparteixis.



Generalitat de Catalunya

/Salut