

LA MAJORIA DELS PACIENTS ESTAN D'ACORD EN FER-SE LES PROVES SI ELS HO PROPOSA UN PROFESSIONAL SANITARI

## RECOMANA-LES!















Quan Presentin una patologia indicativa de possible infecció pel VIH.



Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.



Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb VIH o de qui desconeixen l'estat serològic.



Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu.



Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s'hi.



Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.



CLICKA AQUI PER CONTINUAR











Quan Presentin símptomes i/o signes indicatius d'infecció per hepatitis víriques.

Hagin viscut a un país amb elevada prevalença (Xina, Marroc, Pakistan, Índia, Romania, Egipte, Països sud-saharians...).

Estiguin diagnosticades d'infecció pel VIH.

Hagin mantingut relacions sexuals, sobre tot anals, amb penetració sense protecció.

Van rebre sang o hemoderivats abans de 1992.

Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.

S'hagin fet tatuatges o pírcings sense garanties sanitàries.

Hagin compartit estris d'higiene personal.

Practiquin chemsex o slamsex.

Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual.











