


Recomanacions sobre el lloc d'administració de les vacunes

Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2022

2 mesos



Pn13 (IM)
MenB (IM)

Hexa (IM)

4 mesos



Pn13 (IM)
MenB (IM)

Hexa (IM)
MC (IM)

11 mesos



Pn13 (IM)

Hexa (IM)

12 mesos

SEGUIR RUTINES!!

XRP (IM/SC)
MenB (IM)

MC (IM)



15 mesos



HA (IM)

V (IM/SC)

3 anys

XRP (IM/SC)

V (IM/SC)



6 anys

HA (IM)

DTPa-PI
(IM)



11-12 anys

MACWY (IM)
HA (IM)

VPH (IM)
V (IM/SC)



A l'escola es recomana no administrar
més de dues vacunes en cada visita

Grip (IM)

dTpa (IM)




Es poden administrar amb
immunoglobulina anti-D

Embaràs

Adult > 65 anys

Grip (IM)
Td (IM)

Pn23 (IM)
HZ (IM)



El procediment s'ha de registrar, de manera que es
pugui identificar cada vacuna en cas de reacció local

Quan s'administren dues vacunes en una mateixa
zona anatòmica cal separar-les 2,5-3 cm.